

## Coleottero giapponese: informazioni rivolte ai cittadini

Gentili signore, egregi signori,

come già comunicato negli scorsi anni, persiste la problematica della *Popillia japonica* Newman, insetto comunemente conosciuto come coleottero giapponese. Si tratta di un organismo di quarantena prioritario e inserito nell'allegato 1, sezione 2, dell'Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (RS 916.201).

Il Servizio fitosanitario cantonale riceve giornalmente parecchie chiamate e mail dai cittadini che, giustamente, chiedono informazioni. Per questo motivo, si è deciso d'inviare la qui presente lettera informativa a tutti i Comuni del Cantone, con la preghiera di condividere il Bollettino informativo allegato a tutti i fuochi o, se non possibile, almeno di esporlo negli albi comunali.

Ricordiamo che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha pubblicato la Decisione generale per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman. Cantoni interessati: Ticino, Vallese, Grigioni. Vi invitiamo a voler leggere attentamente i documenti allegati, controllando se e in che zona è inserito il vostro Comune (allegato 1: zona infestata, allegato 2: zona cuscinetto). Nel caso non figurasse in una delle due zone citate, significherebbe che è incluso nella zona indenne.

Oltre alle schede inviatevi con la presente mail, ce ne sono altre disponibili sul nostro sito alla voce Organismi → Insetti → Coleottero giapponese (*Popillia japonica*).

Vi invitiamo a collaborare attivamente mettendo in atto le eventuali misure di contenimento richieste. Ricordiamo che la documentazione viene aggiornata ogni anno, ed è quindi fondamentale verificare gli eventuali cambiamenti ogni primavera.

Siamo consapevoli che alcune misure previste dall'UFAG possano comportare sforzi aggiuntivi in termini finanziari e logistici ma, considerando i danni che un'espansione incontrollata di *Popillia japonica* potrebbe causare, non possiamo che consigliarne la loro applicazione.

Ringraziandovi già sin d'ora per la vostra preziosa collaborazione, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri cordiali saluti.

**PER IL SERVIZIO FITOSANITARIO**  
La Responsabile del Servizio:  
Cristina Marazzi



**Allegati:**  
Bollettino -Informativa coleottero giapponese  
Zone e misure di lotta  
Decisione federale coleottero giapponese

## Bollettino fitosanitario n. 29/2024

### GENERALE

### COLEOTTERO GIAPPONESE: COME RICONOSCERLO E COSA FARE IN CASO DI AVVISTAMENTI

Il coleottero giapponese (*Popillia japonica*, Pj), classificato come organismo di quarantena prioritario, si distingue per la presenza di **ciuffi pelosi bianchi** (5 laterali e 2 più grandi nella parte posteriore) e per le sue piccole dimensioni, ovvero inferiori a una moneta di 5 cts (Figura 1). Esistono altri coleotteri molto simili coi quali ci si può confondere durante la determinazione. Nella Figura 2 sono illustrate le specie di insetti più comuni simili a Pj.



Figura 1: coleottero giapponese a confronto con una moneta di 5 cts.

#### Possibili confusioni



1  
*Popillia japonica*  
Coleottero giapponese,  
8-12 mm.



2  
*Melolontha melolontha*  
Il comune maggiolino,  
25-30 mm, non possiede  
ciuffi bianchi.




3  
*Amphimallon solsitiale*  
Il maggiolino di San  
Giovanni (*Amphimallon  
solsitiale*), 14-20 mm, e  
il maggiolino europeo  
(*Amphimallon majalis*),  
11-14 mm, non hanno  
ciuffi bianchi, possiedono  
elitre color bruno  
rossastro e pronoto  
scuro.



4  
*Anomala vitis*  
Le specie appartenenti  
al genere *Anomala*  
(*Anomala vitis*),  
14-18 mm e  
(*Anomala dubia*),  
11-15 mm, sono  
interamente di colore  
verde tendente al  
marrone-nerastro.



5  
*Mimela junii*  
Il giugnino *Mimela junii*,  
13-16 mm, possiede  
elitre di colore verde  
dorato e molti peli diffusi  
che non si distinguono  
in ciuffi bianchi.  
Ha una forma più ovale  
rispetto al coleottero  
giapponese.



6  
*Phyllopertha horticola*  
Il maggiolino degli orti,  
8-10 mm, possiede molto  
peli diffusi sull'addome  
che non si distinguono  
in ciuffi.

Figura 2 Confronto tra *P. japonica* e altre specie di coleottero indigene.

L'inizio del volo di Pj comincia ai primi di giugno e termina alla fine di settembre, ma è durante le prime due settimane di luglio che si assiste al picco di volo di questo insetto, raggiungendo una quota di individui molto massiccia, soprattutto nelle regioni più colpite che sono in linea di massima quelle zone caratterizzate dalla presenza di zone umide (costituiti da sorgenti e specchi d'acqua naturali o artificiali). L'umidità presente nei prati rappresenta infatti uno dei fattori primari per l'insediamento di questo insetto, condizione necessaria a far crescere le sue larve presenti nel terreno da giugno alla primavera successiva.


Date le numerosissime segnalazioni giunte al nostro Servizio (Servizio fitosanitario cantonale, SFC), riportiamo di seguito le azioni da mettere in pratica in caso di avvistamenti di Pj:

- a) **Nei casi di una presenza maggiore a 500 insetti catturati al giorno, contattare direttamente il SFC;**
- b) Per le altre casistiche chiediamo gentilmente di segnalare la presenza tramite il **modulo online sul sito [www.ti.ch/coleottero-giapponese](http://www.ti.ch/coleottero-giapponese) allegando una fotografia.** Al momento stiamo processando tutti i formulari e le segnalazioni pervenuteci, e malgrado assicuriamo ad ognuno una risposta nel più breve tempo possibile, ci scusiamo per gli attuali tempi di attesa.

In attesa di metodi più solidi proposti dalla Ricerca, per ogni livello d'infestazione sono valide le seguenti misure di lotta e di prevenzione, attualmente riconosciute come essere le più efficaci:

- 1) **CONTROLLARE** che non vi siano insetti su attrezzi, macchinari, materiale, bagagli o vestiti in caso di spostamenti o lavori di giardinaggio, specialmente se ci si trova in una Zona Infestata (zona rossa cfr. Figura 3).
- 2) **CATTURA MANUALE**
  - Raccogliere il coleottero nelle ore più fresche della giornata (mattino presto o sera tardi).
  - Aiutarsi nella raccolta con un contenitore (es: secchio) e sfruttare il fatto che gli insetti quando si sentono in pericolo, si lasciano cadere. Per evitare che i coleotteri catturati scappino dal contenitore, metterci dell'acqua saponata o chiuderlo con un coperchio.
  - Congelare gli insetti per almeno due ore prima di smaltirli con i rifiuti solidi urbani.
- 3) **CATTURA CON TRAPPOLA A FEROMONI**
  - L'utilizzo di trappole a feromoni per la cattura massale è efficace solo in zone ad alta infestazione, come complemento alla cattura manuale, dove notoriamente è già attivo un monitoraggio diffuso comunale.
  - Visto il forte potere attrattivo, per evitare di attirare più insetti dalle zone circostanti rispetto a quelli già presenti, è importante seguire le indicazioni per la posa del Servizio fitosanitario cantonale, disponibili sul sito [www.ti.ch/coleottero-giapponese](http://www.ti.ch/coleottero-giapponese).
- 4) **LIMITARE L'IRRIGAZIONE** artificiale durante luglio-agosto per ostacolare l'ovideposizione.
- 5) **LOTTA ALLE LARVE** con un trattamento a base di nematodi (*Heterorhabditis bacteriophora*). Controllare prima se il terreno in questione contiene effettivamente larve di Pj (sondaggi del terreno a partire dal mese di ottobre)
- 6) È **VIETATO** effettuare trattamenti con prodotti insetticidi non omologati. Oltre che essere inefficaci, un uso improprio potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente.

Per maggiori informazioni consultare il sito [www.ti.ch/coleottero-giapponese](http://www.ti.ch/coleottero-giapponese).



Servizio fitosanitario cantonale  
Viale Stefano Franscini 17  
6501 Bellinzona  
Tel. 091 814 35 57/85/86/87  
[servizio.fitosanitario@ti.ch](mailto:servizio.fitosanitario@ti.ch)  
[www.ti.ch/fitosanitario](http://www.ti.ch/fitosanitario)